

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-7-74 263119

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG-CEDEX

Bulletin n° 25

23 Juillet 1974

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

CARPOCAPSE DES PRUNES

Le vol de la 2ème génération du Carpocapse des prunes a été perturbé par le temps frais et humide ayant sévi sur notre région du 13 au 20 Juillet.

Les captures en pièges sexuels, contrôlées en divers endroits de la Circonscription, en liaison avec la Station de Zoologie de COLMAR (I.N.R.A.), font apparaître un vol moyen dans la plupart des postes de piégeage.

Le nombre d'oeufs déposés est cependant très variable d'une situation à l'autre et les attaques risquent d'être assez importantes localement (10 à 15 % des quetsches portent déjà des pontes dans le secteur de COLMAR -68-).

Comme il est admis qu'un traitement se justifie économiquement lorsque 4 à 5 % des fruits sont infestés, nous recommandons aux producteurs de visiter leurs parcelles et d'intervenir, si nécessaire, dans les conditions suivantes :

- dès réception de la présente note, dans les secteurs de COLMAR, SIGOLSHEIM, RIBEAUVILLE (68) et BARR (67);

- dans la période du 25 au 27 Juillet, dans les autres secteurs de la Circonscription et notamment en LORRAINE.

Utiliser un produit à base de phosalone : 60 g/hl ou azinphos : 40 g/hl.

A préciser que les prunes à maturité précoce dont la cueillette est proche, échappent généralement aux attaques du Carpocapse. Si un traitement devait s'imposer, tenir compte des délais d'emploi des différents produits avant la récolte des fruits.

GRANDES CULTURES

- HOUBLON -

MILDIOU

L'état sanitaire vis-à-vis de cette maladie est satisfaisant. Il est, cependant, recommandé de renouveler la protection fongicide dans la période du 27 au 30 Juillet, car en cette période de pleine floraison ou début conaison (Northern - Brewer) le houblon est très sensible à ce champignon.

.../...

344

PYRALE DU MAIS SUR HOUBLON

Le vol de la Pyrale du maïs se poursuit et les dépôts d'oeufs sur les lianes et les feuilles de houblon sont toujours possibles.

Profiter éventuellement de l'intervention contre le Mildiou pour renouveler la protection contre ce ravageur.

Ce traitement sera également efficace vis-à-vis des Pucerons dont on note une certaine recrudescence.

- BETTERAVES -

CERCOSPORIOSE

Avec le retour du beau temps, les foyers primaires existants n'évoluent que faiblement. Attendre un nouvel avis pour intervenir en traitement généralisé.

CULTURES MARAICHÈRES

SEPTORIOSE DU CELERI

Renouveler la protection des cultures de céleris contre ce champignon.

BRUNISSEMENT DES FEUILLES DE LA CAROTTE

Dès l'apparition des premiers symptômes (taches angulaires brun pâle sur les feuilles) intervenir avec une spécialité à base de manèbe, de mancozèbe ou de captafol, à la dose de 160 g de M.A./hl.

TOUTE CULTURE

CAMPAGNOL DES CHAMPS

Les produits à base de crimidine, quoique plus toxiques que ceux à base de chlorophacinone, peuvent aussi s'employer contre ces ravageurs, à conditions de placer les appâts dans les galeries des rongeurs, c'est-à-dire, hors d'atteinte du gibier et des animaux domestiques.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON.
J. GENNATAS.
C. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER.